

| 癌種    | レジメンNo   | レジメン名              | 1サイクル間隔                     | 投与スケジュール ( ( ) は投与日)  | 用量  |
|-------|----------|--------------------|-----------------------------|---|---|
| 乳癌    | 1001     | F E C 75           | 3週間                         | 1投2休 (1)  | 5-FU 500mg/m <sup>2</sup> CPA 500mg/m <sup>2</sup> EPI 75mg/m <sup>2</sup>            |
| 乳癌    | 1002     | F E C 100          | 3週間                         | 1投2休 (1)  | 5-FU 500mg/m <sup>2</sup> CPA 500mg/m <sup>2</sup> EPI 100mg/m <sup>2</sup>           |
| 乳癌 削除 | 1003-1削除 | Weekly PTX70       | 4週間                         | 3投1休 PTX (1.8.15)   | PTX 70mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1003-2   | Weekly PTX80       | 4週間                         | 3投1休 PTX (1.8.15)   | PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1004     | Weekly PTX         | 1週間                         | 12週間連続(3投0休 合計4サイクル)<br>(1.8.15.22.29.36.43.50.57.64.71.78) | PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1005     | ハーセプチン 1週毎         | 1週間                         | 1投0休 (1)  | ハーセプチン1回目 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg   |
| 乳癌    | 1006     | ハーセプチン 3週毎         | 3週間                         | 1投2休 (1)  | ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg   |
| 乳癌    | 1007-1   | DOC60              | 3週間                         | 1投2休 (1)  | DOC 60mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1007-2   | DOC75              | 3週間                         | 1投2休 (1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1008     | VNR                | 3週間                         | 2投1休 VNR (1.8)  | VNR 25mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1009     | GEM                | 3週間                         | 2投1休 GEM (1.8)  | GEM 1250mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1010     | Nab-PAC            | 3週間                         | 1投2休 (1)  | Nab-PAC 260mg/m <sup>2</sup>  |
| 乳癌    | 1013     | Weekly PTX/ハーセプチン  | 1週間                         | 1投0休 (1)  | PTX 80mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg                                 |
| 乳癌    | 1017     | エリブリン              | 3週間                         | 2投1休 ERI (1.8)  | ERI 1.4mg/m <sup>2</sup>  |
| 乳癌    | 1018     | DOC/CPA (TC)       | 3週間                         | 1投2休 (1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> CPA 600mg/m <sup>2</sup>                                      |
| 乳癌    | 1023     | Weekly PTX/Beva    | PTX4週間 Beva2週間              | PTX 3投1休 (1.8.15) Beva 1投1休 (1.15)                          | PTX 80mg/m <sup>2</sup> Beva 10mg/kg  |
| 乳癌    | 1024     | DOC/ハーセプチン         | 3週間                         | 1投2休 (1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg                                 |
| 乳癌    | 1025     | DOC/ハーセプチン/パージェタ   | 3週間                         | 1投2休 (1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージェタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body  |
| 乳癌    | 1026     | PTX/ハーセプチン         | PTX1週間 ハーセプチン3週間            | PTX 1投0休 (1) ハーセプチン 1投2休 (1)                                | PTX 80mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg                                 |
| 乳癌    | 1027     | PTX/ハーセプチン/パージェタ   | PTX 1週間<br>ハーセプチン/パージェタ 3週間 | PTX 1投0休 (1) ハーセプチン・パージェタ 1投2休 (1)                          | PTX 80mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージェタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body  |
| 乳癌    | 1028     | ハーセプチン/パージェタ       | 3週間                         | 1投2休 (1)  | ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージェタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body                          |
| 乳癌    | 1029     | カドサイラ              | 3週間                         | 1投2休 (1)  | カドサイラ 3.6mg/kg  |
| 乳癌    | 1030     | XT療法               | 3週間                         | 1投2休 DOC (1) カベシタピン 2投1休 (1~14)                             | カベシタピン1回量は体表面積で算出 DOC 60mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌    | 1031     | Beva (併用薬PTX中止後)   | 2週間                         | 1投1休 (1)  | Beva 10mg/kg  |
| 乳癌    | 1032     | VNR/ハーセプチン/パージェタ   | 3週間                         | VNR 2投1休 (1.8) ハーセプチン・パージェタ 1投2休(1)                         | VNR 25mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージェタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body  |
| 乳癌    | 1033     | TC/ハーセプチン          | 3週間                         | 1投2休 (1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> CPA 600mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降6mg/kg         |
| 乳癌    | 1034     | エリブリン/ハーセプチン/パージェタ | 3週間                         | ERI 2投1休 (1.8) ハーセプチン・パージェタ 1投2休(1)                         | ERI 1.4mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージェタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body |
| 乳癌    | 1035     | EC療法               | 3週間                         | 1投2休 (1)  | CPA 600mg/m <sup>2</sup> EPI 90mg/m <sup>2</sup>                                      |
| 乳癌    | 1036     | AC療法               | 3週間                         | 1投2休 (1)  | CPA 600mg/m <sup>2</sup> ADM 60mg/m <sup>2</sup>                                      |
| 乳癌    | 1037     | dose-denseAC療法     | 2週間                         | 1投1休 (1)  | CPA 600mg/m <sup>2</sup> ADM 60mg/m <sup>2</sup>                                      |
| 乳癌    | 1038     | dose-densePTX療法    | 2週間                         | 1投1休 (1)  | PTX 175mg/m <sup>2</sup>  |

|            |        |                        |                                       |  |   |
|------------|--------|------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 乳癌         | 1039   | TC療法+HP                | 3週間                                   | 1投2休(1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> CPA 600mg/m <sup>2</sup> ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージエタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body                               |
| 乳癌         | 1040   | テセントリク/Nab-PAC         | テセントリク2週間<br>Nab-PTX4週間               | テセントリク1投1休(1.15) Nab-PAC3投1休(1.8.15)                         | テセントリク840mg/body Nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌         | 1041   | エンハーツ                  | 3週間                                   | 1投2休(1)  | エンハーツ 5.4mg/kg  |
| 乳癌         | 1042   | DOC/CBDCA/H            | 3週間                                   | 1投2休(1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC6 ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg  |
| 乳癌         | 1043   | DOC/CBDCA/HP           | 3週間                                   | 1投2休(1)  | DOC 75mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC6 ハーセプチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージエタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body   |
| 乳癌         | 1044-1 | キイトルーダ【3週間】/CBDCA/GEM  | 3週間                                   | キイトルーダ1投2休(1) CBDCA/GEM 2投1休(1.8)                            | キイトルーダ200mg/body CBDCA AUC2 GEM1000mg/m <sup>2</sup>  |
| 乳癌         | 1045-1 | キイトルーダ【3週間】/wPTX       | 12週間<br>〔キイトルーダ(3週間)<br>PTX(4週間)〕     | キイトルーダ1投2休(1.22.43.64) PTX 3投1休(1.8.15.29.36.43.57.64.71)    | キイトルーダ200mg/body PTX90mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌         | 1046-1 | キイトルーダ【3週間】/nab-PTX    | 12週間<br>〔キイトルーダ(3週間)<br>nab-PTX(4週間)〕 | キイトルーダ1投2休(1.22.43.64) nabPTX 3投1休(1.8.15.29.36.43.57.64.71) | キイトルーダ200mg/body nabPTX100mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌         | 1047-1 | キイトルーダ【3週間】/wPTX/CBDCA | 3週間                                   | キイトルーダ1投2休(1) PTX/CBDCA 3投0休(1.8.15)                         | キイトルーダ200mg/body CBDCA AUC1.5 PTX80mg/m <sup>2</sup>  |
| 乳癌         | 1048-1 | キイトルーダ【3週間】/EC療法       | 3週間                                   | 1投2休(1)  | キイトルーダ200mg/body CPA 600mg/m <sup>2</sup> EPI 90mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌         | 1049-1 | キイトルーダ【3週間】/AC療法       | 3週間                                   | 1投2休(1)  | キイトルーダ200mg/body CPA 600mg/m <sup>2</sup> ADM 60mg/m <sup>2</sup>   |
| 乳癌         | 1050-1 | adju.キイトルーダ(3週)        | 3週間                                   | 1投2休(1)  | キイトルーダ 200mg/body   |
| 乳癌         | 1050-2 | adju.キイトルーダ(6週)        | 6週間                                   | 1投5休(1)  | キイトルーダ 400mg/body   |
| 乳癌         | 1051   | DOC/フェスゴ配合皮下注          | 3週間                                   | 1投2休(1)  | 初回 DOC 75mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2回目以降 DOC 75mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注MA 1V   |
| 乳癌         | 1052   | wPTX/フェスゴ配合皮下注         | PTX 1週間<br>フェスゴ配合皮下注 3週間              | PTX 1投0休(1) フェスゴ配合皮下注 1投2休(1)                                | 1コース目 PTX 80mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2コース目以降 PTX 80mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注MA 1V  |
| 乳癌         | 1053   | フェスゴ配合皮下注              | 3週間                                   | 1投2休(1)  | 初回 フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2回目以降 フェスゴ配合皮下注MA 1V   |
| 乳癌         | 1054   | VNR/フェスゴ配合皮下注          | 3週間                                   | VNR 2投1休(1.8) フェスゴ配合皮下注 1投2休(1)                              | 1コース目 VNR 25mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2コース目以降 VNR 25mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注MA 1V  |
| 乳癌         | 1055   | エリプリン/フェスゴ配合皮下注        | 3週間                                   | ERI 2投1休(1.8) フェスゴ配合皮下注 1投2休(1)                              | 1コース目 ERI 1.4mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2コース目以降 ERI 1.4mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注MA 1V  |
| 乳癌         | 1056   | TC療法/フェスゴ配合皮下注         | 3週間                                   | 1投2休(1)  | 初回 DOC 75mg/m <sup>2</sup> CPA 600mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2回目以降 DOC 75mg/m <sup>2</sup> CPA 600mg/m <sup>2</sup> フェスゴ配合皮下注MA 1V |
| 乳癌         | 1057   | DOC/CBDCA/フェスゴ配合皮下注    | 3週間                                   | 1投2休(1)  | 初回 DOC 75mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC6 フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2回目以降 DOC 75mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC6 フェスゴ配合皮下注MA 1V                             |
| 乳癌         | 1058-1 | トロデルビ(1コース目)           | 3週間                                   | 2投1休(1,8)  | トロデルビ 10mg/kg   |
| 乳癌         | 1058-2 | トロデルビ(2コース目以降)         | 3週間                                   | 2投1休(1,8)  | トロデルビ 10mg/kg   |
| 乳癌         | 1059-1 | ダトロウェイ(1コース目)          | 3週間                                   | 1投2休(1)  | ダトロウェイ 6mg/kg   |
| 乳癌         | 1059-2 | ダトロウェイ(2コース目以降)        | 3週間                                   | 1投2休(1)  | ダトロウェイ 6mg/kg   |
| 小細胞肺癌      | 1101   | CDDP/VP-16             | 4週間                                   | 1投(3連日)3休 CDDP(1) VP-16(1.2.3)                               | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VP-16 100mg/m <sup>2</sup>   |
| 小細胞肺癌      | 1102   | NGT                    | 3週間                                   | 1投(5連日(1.2.3.4.5))2休   | NGT 1.0mg/m <sup>2</sup>  |
| 小細胞肺癌      | 1103   | GEM/CPT-11             | 2週間                                   | 1投1休(1)  | GEM 1000mg/m <sup>2</sup> CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>   |
| 小細胞肺癌      | 1104   | Weekly CPT-11          | 4週間                                   | 3投1休 CPT-11(1.8.15)  | CPT-11 100mg/m <sup>2</sup>   |
| 小細胞肺癌      | 1105   | CDDP/CPT-11            | 4週間                                   | CDDP 1投3休(1) CPT-11 3投1休(1.8.15)                             | CDDP 60mg/m <sup>2</sup> CPT-11 60mg/m <sup>2</sup>   |
| 小細胞肺癌      | 1106   | AMR                    | 4週間                                   | 1投(3連日(1.2.3))3休   | AMR 35~40mg/m <sup>2</sup>  |
| 小細胞肺癌(一般)  | 1107   | CBDCA/VP-16(一般用)       | 4週間                                   | 1投(3連日)3休 CBDCA(1) VP-16(1.2.3)                              | CBDCA AUC5 VP-16 100mg/m <sup>2</sup>   |
| 小細胞肺癌(高齢者) | 1108   | CBDCA/VP-16(高齢者用)      | 4週間                                   | 1投(3連日)3休 CBDCA(1) VP-16(1.2.3)                              | CBDCA AUC5 VP-16 80mg/m <sup>2</sup>  |

|            |        |                                |       |                                       |  |
|------------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--|
| 小細胞肺癌（一般）  | 1109   | CBDCA/VP-16/テセントリク（一般用）        | 4週間   | 1投（3連日）3休（CBDCA・テセントリク 1 VP-16 1,2,3） | CBDCA AUC5 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> テセントリク1200mg/body                |
| 小細胞肺癌（高齢者） | 1110   | CBDCA/VP-16/テセントリク（高齢者用）       | 4週間   | 1投（3連日）3休（CBDCA・テセントリク 1 VP-16 1,2,3） | CBDCA AUC5 VP-16 80mg/m <sup>2</sup> テセントリク1200mg/body                 |
| 小細胞肺癌      | 1111   | テセントリク                         | 3週間   | 1投2休（1）                               | テセントリク 1200mg/body   |
| 小細胞肺癌      | 1112   | 放射線併用 CDDP/VP-16               | 4週間   | 1投（3連日）3休 CDDP（1） VP-16（1,2,3）        | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VP-16 100mg/m <sup>2</sup>                    |
| 小細胞肺癌（一般）  | 1113   | 放射線併用 CBDCA/VP-16（一般用）         | 4週間   | 1投（3連日）3休 CBDCA（1） VP-16（1,2,3）       | CBDCA AUC5 VP-16 100mg/m <sup>2</sup>                                  |
| 小細胞肺癌（高齢者） | 1114   | 放射線併用 CBDCA/VP-16（高齢者用）        | 4週間   | 1投（3連日）3休 CBDCA（1） VP-16（1,2,3）       | CBDCA AUC5 VP-16 80mg/m <sup>2</sup>                                   |
| 小細胞肺癌（一般）  | 1115-1 | CBDCA/VP-16/イミフィンジ（一般用）30kg超え  | 3週間   | 1投（3連日）2休（CBDCA・イミフィンジ 1 VP-16 1,2,3） | CBDCA AUC5~6 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 1500mg/body             |
| 小細胞肺癌（一般）  | 1115-2 | CBDCA/VP-16/イミフィンジ（一般用）30kg以下  | 3週間   | 1投（3連日）2休（CBDCA・イミフィンジ 1 VP-16 1,2,3） | CBDCA AUC5~6 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 20mg/kg                 |
| 小細胞肺癌（高齢者） | 1116-1 | CBDCA/VP-16/イミフィンジ（高齢者用）30kg超え | 3週間   | 1投（3連日）2休（CBDCA・イミフィンジ 1 VP-16 1,2,3） | CBDCA AUC5 VP-16 80mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 1500mg/body                |
| 小細胞肺癌（高齢者） | 1116-2 | CBDCA/VP-16/イミフィンジ（高齢者用）30kg以下 | 3週間   | 1投（3連日）2休（CBDCA・イミフィンジ 1 VP-16 1,2,3） | CBDCA AUC5 VP-16 80mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 20mg/kg                    |
| 小細胞肺癌（一般）  | 1117-1 | CDDP/VP-16/イミフィンジ（一般用）30kg超え   | 3週間   | 1投（3連日）2休（CDDP・イミフィンジ 1 VP-16 1,2,3）  | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VP-16 100mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 1500mg/body |
| 小細胞肺癌（一般）  | 1117-2 | CDDP/VP-16/イミフィンジ（一般用）30kg以下   | 3週間   | 1投（3連日）2休（CDDP・イミフィンジ 1 VP-16 1,2,3）  | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VP-16 100mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 20mg/kg     |
| 小細胞肺癌      | 1118-1 | イミフィンジ（メンテナンス）30kg超え           | 4週間   | 1投3休（1）                               | イミフィンジ 1500mg/body   |
| 小細胞肺癌      | 1118-2 | イミフィンジ（メンテナンス）30kg以下           | 4週間   | 1投3休（1）                               | イミフィンジ 20mg/kg   |
| 非小細胞肺癌     | 1201   | CBDCA/Weekly PTX               | 4週間   | CBDCA 1投3休(1) PTX 3投1休(1,8,15)        | CBDCA AUC4~6 PTX 60mg/m <sup>2</sup>                                   |
| 非小細胞肺癌     | 1202   | DOC                            | 3週間   | 1投2休（1）                               | DOC 60mg/m <sup>2</sup>  |
| 非小細胞肺癌     | 1203   | GEM                            | 4週間   | 3投1休 GEM（1,8,15）                      | GEM 1000mg/m <sup>2</sup>  |
| 非小細胞肺癌     | 1204   | VNR                            | 4週間   | 3投1休 VNR（1,8,15）                      | VNR 25mg/m <sup>2</sup>  |
| 非小細胞肺癌     | 1205   | CBDCA/PTX                      | 4週間   | 1投3休（1）                               | CBDCA AUC4~6 PTX 200mg/m <sup>2</sup>                                  |
| 非小細胞肺癌     | 1206   | Weekly CPT-11                  | 4週間   | 3投1休 CPT-11（1,8,15）                   | CPT-11 100mg/m <sup>2</sup>  |
| 非小細胞肺癌     | 1207   | AMR                            | 4週間   | 1投（3連日（1,2,3））3休                      | AMR 35~40mg/m <sup>2</sup>   |
| 非小細胞肺癌     | 1208   | PEM                            | 3週間   | 1投2休（1）                               | ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup>   |
| 非小細胞肺癌     | 1209削除 | CBDCA/Weekly PTX/Beva          | 4週間   | CBDCA /Beva 1投3休(1) PTX 3投1休(1,8,15)  | CBDCA AUC4~6 PTX 60mg/m <sup>2</sup> Beva 15mg/kg                      |
| 非小細胞肺癌     | 1210   | PEM/CBDCA                      | 3週間   | 1投2休（1）                               | ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC4~6                              |
| 非小細胞肺癌     | 1211   | CBDCA/PTX/Beva                 | 3週間   | 1投2休（1）                               | CBDCA AUC5~6 PTX 200mg/m <sup>2</sup> Beva 15mg/kg                     |
| 非小細胞肺癌     | 1212   | PEM/CBDCA/Beva                 | 3週間   | 1投2休（1）                               | ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC4~6 Beva 15mg/kg                 |
| 非小細胞肺癌     | 1213   | GEM/CPT-11                     | 2週間   | 1投1休（1）                               | GEM 1000mg/m <sup>2</sup> CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>                  |
| 非小細胞肺癌     | 1214   | CDDP/VNR                       | 3~4週間 | CDDP1投2~3休(1) VNR 2投1~2休(1,8)         | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VNR 25mg/m <sup>2</sup>                       |
| 非小細胞肺癌     | 1215   | CDDP/PEM                       | 3~4週間 | 1投2~3休（1）                             | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup>                  |
| 非小細胞肺癌     | 1216   | CDDP/DOC                       | 3~4週間 | 1投2~3休（1）                             | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> DOC 60mg/m <sup>2</sup>                       |
| 非小細胞肺癌     | 1217   | CDDP/GEM                       | 3~4週間 | CDDP 1投2~3休(1) GEM 2投1~2休(1,8)        | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup>                     |
| 非小細胞肺癌     | 1218   | CDDP/CPT-11                    | 4週間   | CDDP 1投3休(1) CPT-11 3投1休(1,8,15)      | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> CPT-11 60mg/m <sup>2</sup>                    |
| 非小細胞肺癌     | 1219   | CBDCA/GEM                      | 3~4週間 | CBDCA 1投2~3休(1) GEM2投1~2休(1,8)        | CBDCA AUC5 GEM 1000mg/m <sup>2</sup>                                   |

|        |        |   |                              |   |   |
|--------|--------|---|------------------------------|---|---|
| 非小細胞肺癌 | 1220   | TS-1/CDDP   | 3~4週間                        | CDDP 1投2~3休(1) S-1 2投1~2休(1~14)           | TS-1 1回量は体表面積で算出 CDDP 60mg/m <sup>2</sup>                           |
| 非小細胞肺癌 | 1221   | TS-1/CBDCA  | 3~4週間                        | CBDCA 1投2~3休(1) S-1 2投1~2休(1~14)          | TS-1 1回量は体表面積で算出 CBDCA AUC4~6                                       |
| 非小細胞肺癌 | 1222   | Beva (メンテナンス用)  | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | Beva 15mg/kg  |
| 非小細胞肺癌 | 1223   | PEM/Beva (メンテナンス用)  | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup> Beva 15mg/kg                           |
| 非小細胞肺癌 | 1224   | CBDCA/Weekly Nab PTX                                      | 3週間                          | CBDCA 1投2休(1) Nab-PAC 3投0休(1.8.15)        | CBDCA AUC6 Nab-PAC 100mg/m <sup>2</sup>                             |
| 非小細胞肺癌 | 1225-1 | CBDCA/PTX (放射線併用) (次レジメン1225-2へ)                          | 8週間                          | 6投2休(1.8.15.22.29.36)                     | CBDCA AUC2 PTX 40mg/m <sup>2</sup>                                  |
| 非小細胞肺癌 | 1225-2 | CBDCA/PTX (地固め)   | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | CBDCA AUC5 PTX 200mg/m <sup>2</sup>                                 |
| 非小細胞肺癌 | 1225-3 | CBDCA/PTX (放射線併用) (次レジメン1234へ)                            | 6週間                          | 6投0休(1.8.15.22.29.36)                     | CBDCA AUC2 PTX 40mg/m <sup>2</sup>                                  |
| 非小細胞肺癌 | 1226-1 | オブジーボ (2週)  | 2週間                          | 1投1休(1)                                   | オブジーボ 240mg/body  |
| 非小細胞肺癌 | 1226-2 | オブジーボ (4週)  | 4週間                          | 1投3休(1)                                   | オブジーボ 480mg/body  |
| 非小細胞肺癌 | 1227   | CDDP/VNR(放射線併用)   | 4週間                          | CDDP 1投3休(1) VNR 2投2休(1.8)                | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VNR 20mg/m <sup>2</sup>                    |
| 非小細胞肺癌 | 1228   | DOC/RAM   | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | DOC 60mg/m <sup>2</sup> RAM 10mg/kg                                 |
| 非小細胞肺癌 | 1229-1 | CBDCA/Weekly Nab PTX(放射線併用)                               | 8週間                          | 6投2休(1.8.15.22.29.36)                     | CBDCA AUC2 Nab-PAC 50mg/m <sup>2</sup>                              |
| 非小細胞肺癌 | 1229-2 | CBDCA/Weekly Nab PTX(放射線併用) 終了後、地固め療法                     | 3週間                          | CBDCA 1投2休(1) Nab-PAC 3投0休(1.8.15)        | CBDCA AUC6 Nab-PAC 100mg/m <sup>2</sup>                             |
| 非小細胞肺癌 | 1229-3 | CBDCA/Weekly Nab PTX(放射線併用) 次レジメンはイミフィンジ単剤へ (No.1234レジメン) | 6週間                          | 6投0休(1.8.15.22.29.36)                     | CBDCA AUC2 Nab-PAC 50mg/m <sup>2</sup>                              |
| 非小細胞肺癌 | 1230   | CBDCA同時胸部放射線療法  | 6週間                          | 4投(5連日) 2休(CBDCA 1~5, 8~12, 15~19, 22~26) | CBDCA 30mg/m <sup>2</sup>   |
| 非小細胞肺癌 | 1231-1 | TS-1/CDDP/同時胸部放射線療法                                       | 4週間                          | CDDP 1投3休(1) S-1 2投2休(1~14) 合計2サイクル       | TS-1 1回量は体表面積で算出 CDDP 60mg/m <sup>2</sup> 胸部放射線療法併用                 |
| 非小細胞肺癌 | 1231-2 | TS-1/CDDP/同時胸部放射線後、地固め                                    | 4週間                          | CDDP 1投3休(1) S-1 2投2休(1~14) 合計2サイクル       | TS-1 1回量は体表面積で算出 CDDP 60mg/m <sup>2</sup>                           |
| 非小細胞肺癌 | 1232-1 | キイトルーダ (3週)   | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | キイトルーダ 200mg/body   |
| 非小細胞肺癌 | 1232-2 | キイトルーダ (6週)   | 6週間                          | 1投5休(1)                                   | キイトルーダ 400mg/body   |
| 非小細胞肺癌 | 1233   | テセントリク  | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | テセントリク 1200mg/body  |
| 非小細胞肺癌 | 1234-1 | イミフィンジ(30kg超え)  | 4週間                          | 1投3休(1)                                   | イミフィンジ 1500mg/body  |
| 非小細胞肺癌 | 1234-2 | イミフィンジ(30kg以下)  | 4週間                          | 1投3休(1)                                   | イミフィンジ 20mg/kg  |
| 非小細胞肺癌 | 1235   | キイトルーダ/CBDCA/Nab-PTX                                      | 3週間                          | キイトルーダ・CBDCA 1投2休(1) Nab-PAC 3投0休(1.8.15) | CBDCA AUC6 Nab-PAC 100mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body           |
| 非小細胞肺癌 | 1236   | キイトルーダ/CBDCA/PEM  | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup> CBDCA AUC6 キイトルーダ 200mg/body           |
| 非小細胞肺癌 | 1237   | キイトルーダ/PEM (メンテナンス)                                       | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | ペムトレキセド 500mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body                      |
| 非小細胞肺癌 | 1238   | テセントリク/Beva/CBDCA/PTX                                     | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | テセントリク 1200mg/body Beva 15mg/kg CBDCA AUC6 PTX 200mg/m <sup>2</sup> |
| 非小細胞肺癌 | 1239   | テセントリク/Beva (メンテナンス)                                      | 3週間                          | 1投2休(1)                                   | テセントリク 1200mg/body Beva 15mg/kg                                     |
| 非小細胞肺癌 | 1240   | オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PTX                                      | 3週間(オブジーボ/ヤーボイ)<br>6週間(ヤーボイ) | オブジーボ・CBDCA・PTX 1投2休(1.22) ヤーボイ 1投5休(1)   | オブジーボ 360mg/body ヤーボイ1mg/kg CBDCA AUC5 PTX 175mg/m <sup>2</sup>     |
| 非小細胞肺癌 | 1241   | オブジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PEM                                      | 3週間(オブジーボ/ヤーボイ)<br>6週間(ヤーボイ) | オブジーボ・CBDCA・PEM 1投2休(1.22) ヤーボイ 1投5休(1)   | オブジーボ 360mg/body ヤーボイ1mg/kg CBDCA AUC5又6 PEM 500mg/m <sup>2</sup>   |
| 非小細胞肺癌 | 1242-1 | オブジーボ (2) /ヤーボイ (6)                                       | 2週間(オブジーボ)<br>6週間(ヤーボイ)      | オブジーボ 1投1休(1.15.29) ヤーボイ 1投5休(1)          | オブジーボ 240mg/body ヤーボイ1mg/kg   |
| 非小細胞肺癌 | 1242-2 | オブジーボ (2) /ヤーボイ (6) [メンテナンス用]                             | 2週間(オブジーボ)<br>6週間(ヤーボイ)      | オブジーボ 1投1休(1.15.29) ヤーボイ 1投5休(1)          | オブジーボ 240mg/body ヤーボイ1mg/kg   |
| 非小細胞肺癌 | 1243-1 | オブジーボ (3) /ヤーボイ (6)                                       | 3週間(オブジーボ)<br>6週間(ヤーボイ)      | オブジーボ 1投2休(1.22) ヤーボイ 1投5休(1)             | オブジーボ 360mg/body ヤーボイ1mg/kg   |

|         |        |                                   |                           |   |  |
|---------|--------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|
| 非小細胞肺癌  | 1243-2 | オプジーボ (3) / ヤーボイ (6) [メテカス用]      | 3週間 (オプジーボ)<br>6週間 (ヤーボイ) | オプジーボ 1投2休 (1.22) ヤーボイ 1投5休 (1)             | オプジーボ 360mg/body ヤーボイ1mg/kg  |
| 非小細胞肺癌  | 1244   | RAM [Iリチンブ またはゲマテキブ 併用]           | 2週間                       | 1投1休 (1)                                    | RAM 10mg/kg  |
| 非小細胞肺癌  | 1245   | Weekly Nab PTX                    | 3週間                       | 3投0休 PTX (1.8,15)                           | Nab-PAC 100mg/ml   |
| 非小細胞肺癌  | 1246   | Weekly PTX80                      | 4週間                       | 3投1休 PTX (1.8,15)                           | PTX 80mg/ml  |
| 非小細胞肺癌  | 1247   | テセントリク/CBDCA/Nab-PTX              | 3週間                       | テセントリク・CBDCA 1投2休 (1) Nab-PAC 3投0休 (1.8,15) | CBDCA AUC6 Nab-PAC 100mg/ml テセントリク 1200mg/body   |
| 非小細胞肺癌  | 1248   | テセントリク/CBDCA/PEM                  | 3週間                       | 1投2休 (1)                                    | ペムトレキセド 500mg/ml CBDCA AUC6 テセントリク1200mg/body  |
| 非小細胞肺癌  | 1249   | テセントリク/PEM (メンテナンス)               | 3週間                       | 1投2休 (1)                                    | ペムトレキセド 500mg/ml テセントリク 1200mg/body  |
| 非小細胞肺癌  | 1250   | NAC オプジーボ / CBDCA/PTX             | 3週間                       | オプジーボ・CBDCA・PTX 1投2休 (1)                    | オプジーボ 360mg/body CBDCA AUC5 PTX 175mg/ml   |
| 非小細胞肺癌  | 1251   | NAC オプジーボ / CBDCA/PEM             | 3週間                       | オプジーボ・CBDCA・PEM 1投2休 (1)                    | オプジーボ 360mg/body CBDCA AUC5 PEM 500mg/ml   |
| 非小細胞肺癌  | 1252   | ポートラザ/CDDP/GEM                    | 3週間                       | CDDP 1投2休(1) ポートラザ・GEM 2投1休 (1.8)           | ポートラザ 800mg/body CDDP 75mg/ml GEM 1250mg/ml  |
| 非小細胞肺癌  | 1253   | ポートラザ (メンテナンス)                    | 3週間                       | ポートラザ 2投1休 (1.8)                            | ポートラザ 800mg/body   |
| 非小細胞肺癌  | 1254   | オシメルチニブ/CBDCA/PEM                 | 3週間                       | CBDCA・PEM 1投2休 (1) オシメルチニブ連日服用              | ペムトレキセド 500mg/ml CBDCA AUC5 オシメルチニブ80mg/日  |
| 非小細胞肺癌  | 1255   | オシメルチニブ/PEM (メンテナンス)              | 3週間                       | PEM 1投2休 (1) オシメルチニブ連日服用                    | ペムトレキセド 500mg/ml オシメルチニブ80mg/日   |
| 非小細胞肺癌  | 1256-1 | 80kg未満 ライブリバント/PEM/CBDCA (1ケル目)   | 3週間                       | ライブリバント1投2休 (1.2,8,15) PEM・CBDCA 1投2休 (1)   | ライブリバント [day1 350mg/body day2 1050mg/body day8 1400mg/body day15 1400mg/body]<br>PEM 500mg/ml CBDCA AUC5 |
| 非小細胞肺癌  | 1256-2 | 80kg以上 ライブリバント/PEM/CBDCA (1ケル目)   | 3週間                       | ライブリバント1投2休 (1.2,8,15) PEM・CBDCA 1投2休 (1)   | ライブリバント [day1 350mg/body day2 1400mg/body day8 1750mg/body day15 1750mg/body]<br>PEM 500mg/ml CBDCA AUC5 |
| 非小細胞肺癌  | 1257-1 | 80kg未満 ライブリバント/PEM/CBDCA (2ケル目)   | 3週間                       | ライブリバント・PEM・CBDCA 1投2休 (1)                  | ライブリバント1400mg/body PEM 500mg/ml CBDCA AUC5   |
| 非小細胞肺癌  | 1257-2 | 80kg以上 ライブリバント/PEM/CBDCA (2ケル目)   | 3週間                       | ライブリバント・PEM・CBDCA 1投2休 (1)                  | ライブリバント1750mg/body PEM 500mg/ml CBDCA AUC5   |
| 非小細胞肺癌  | 1258-1 | 80kg未満 ライブリバント/PEM/CBDCA (3・4ケル目) | 3週間                       | ライブリバント・PEM・CBDCA 1投2休 (1)                  | ライブリバント1750mg/body PEM 500mg/ml CBDCA AUC5   |
| 非小細胞肺癌  | 1258-2 | 80kg未満 ライブリバント/PEM/CBDCA (3・4ケル目) | 3週間                       | ライブリバント・PEM・CBDCA 1投2休 (1)                  | ライブリバント2100mg/body PEM 500mg/ml CBDCA AUC5   |
| 非小細胞肺癌  | 1259-1 | 80kg未満 ライブリバント/PEM/CBDCA (5ケル目以降) | 3週間                       | ライブリバント・PEM 1投2休 (1)                        | ライブリバント1750mg/body PEM 500mg/ml  |
| 非小細胞肺癌  | 1259-2 | 80kg以上 ライブリバント/PEM/CBDCA (5ケル目以降) | 3週間                       | ライブリバント・PEM 1投2休 (1)                        | ライブリバント2100mg/body PEM 500mg/ml  |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1301   | CDDP/PEM                          | 3~4週間                     | 1投2~3休 (1)                                  | CDDP 75mg/ml ペムトレキセド 500mg/ml  |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1302-1 | オプジーボ (2週)                        | 2週間                       | 1投1休 (1)                                    | オプジーボ 240mg/body   |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1302-2 | オプジーボ (4週)                        | 4週間                       | 1投3休 (1)                                    | オプジーボ 480mg/body   |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1303   | PEM/CBDCA                         | 3週間                       | 1投2休 (1)                                    | ペムトレキセド 500mg/ml CBDCA AUC5  |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1304   | オプジーボ (2) / ヤーボイ (6)              | 2週間 (オプジーボ)<br>6週間 (ヤーボイ) | オプジーボ 1投1休 (1.15,29) ヤーボイ 1投5休 (1)          | オプジーボ 240mg/body ヤーボイ1mg/kg  |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1305   | オプジーボ (3) / ヤーボイ (6)              | 3週間 (オプジーボ)<br>6週間 (ヤーボイ) | オプジーボ 1投2休 (1.22) ヤーボイ 1投5休 (1)             | オプジーボ 360mg/body ヤーボイ1mg/kg  |
| 胃癌      | 1401削除 | CDDP/CPT-11                       | CDDP 4週間<br>CPT-11 2週間    | CDDP 1投3休 (1) CPT-11 1投1休 (1.15)            | CDDP 80mg/ml CPT-11 70mg/ml  |
| 胃癌      | 1402   | Weekly PTX                        | 4週間                       | 3投1休 PTX (1.8,15)                           | PTX 80mg/ml  |
| 胃癌      | 1403   | biweekly CPT-11                   | 2週間                       | 1投1休 (1)                                    | CPT-11 150mg/ml  |
| 胃癌      | 1404   | MF (MTX/5-FU)                     | 1週間                       | 1投0休 (1)                                    | MTX 100mg/ml 5-FU 600mg/ml   |
| 胃癌      | 1405   | TS-1/CDDP                         | 5週間                       | CDDP (8) S-1 3投2休 (1~21)                    | TS-1 1回量は体表面積で算出 CDDP 60mg/ml  |
| 胃癌      | 1406削除 | TS-1/PTX                          | 3週間                       | 2投1休 (PTX 1.8 S-1 1~14)                     | TS-1 1回量は体表面積で算出 PTX 50mg/ml   |

|    |        |                        |                                |  |  |
|----|--------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| 胃癌 | 1407   | XP療法 (カベシタピン/CDDP)     | 3週間                            | CDDP 1投2休(1) カベシタピン 2投1休 (1~14)            | カベシタピン1回量は体表面積で算出 CDDP 80mg /㎡   |
| 胃癌 | 1408   | XP療法/トラスツズマブ           | 3週間                            | CDDP/Her2 1投2休(1) カベシタピン 2投1休 (1~14)       | カベシタピン1回量は体表面積で算出 CDDP 80mg /㎡ トラスツズマブ1回目 8mg /kg ・2回目以降6mg/kg                         |
| 胃癌 | 1409   | Weekly PTX/トラスツズマブ     | PTX 4週間<br>トラスツズマブ3週間          | PTX 3投1休 (1.8.15) トラスツズマブ 1投2休(1)          | PTX 80mg /㎡ トラスツズマブ1回目 8mg /kg ・2回目以降6mg/kg  |
| 胃癌 | 1410   | G-XELOX (130)          | 3週間                            | L-OHP 1投2休(1) カベシタピン2投1休 (1~14)            | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡   |
| 胃癌 | 1411   | G-SOX (100)            | 3週間                            | L-OHP 1投2休(1) S-1 2投1休 (1~14)              | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 100mg /㎡   |
| 胃癌 | 1412   | G-SOX (130)            | 3週間                            | L-OHP 1投2休(1) S-1 2投1休 (1~14)              | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡   |
| 胃癌 | 1413-1 | TS-1/DOC               | 3週間                            | DOC 1投2休(1) S-1 2投1休 (1~14)                | TS-1 1回量は体表面積で算出 DOC 40mg /㎡   |
| 胃癌 | 1413-2 | adju.DS療法              | 3週間                            | DOC 1投2休(1) S-1 2投1休(1~14)                 | TS-1 1回量は体表面積で算出 DOC 40mg /㎡   |
| 胃癌 | 1414   | RAM+Weekly PTX 80      | RAM 2週間<br>PTX 4週間             | RAM1投1休/PTX3投1休 (RAM 1.15 PTX 1.8.15)      | RAM 8mg /kg PTX80mg /㎡   |
| 胃癌 | 1415   | RAM                    | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | RAM 8mg /kg  |
| 胃癌 | 1416-1 | 高度催吐用G-XELOX (130)adju | 3週間                            | L-OHP 1投2休(1) カベシタピン2投1休 (1~14)            | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡   |
| 胃癌 | 1416-2 | G-XELOX (130)adju      | 3週間                            | L-OHP 1投2休(1) カベシタピン 2投1休 (1~14)           | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡   |
| 胃癌 | 1417   | G-SOX (100)+Her        | 3週間                            | L-OHP ・トラスツズマブ1投2休(1) S-1 2投1休 (1~14)      | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 100mg /㎡ トラスツズマブ1回目 8mg /kg ・2回目以降6mg/kg                         |
| 胃癌 | 1418   | G-SOX (130)+Her        | 3週間                            | L-OHP ・トラスツズマブ1投2休(1) S-1 2投1休 (1~14)      | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ トラスツズマブ1回目 8mg /kg ・2回目以降6mg/kg                         |
| 胃癌 | 1419-1 | G-FOLFOX6              | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | L-OHP 85mg /㎡ 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡                                    |
| 胃癌 | 1419-2 | 末梢用G-FOLFOX6           | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | L-OHP 85mg /㎡ 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡                                    |
| 胃癌 | 1420   | TS-1/Her               | トラスツズマブ 3週間<br>TS-1は、6週間または3週間 | トラスツズマブ1投2休(1)<br>TS-1のスケジュールは4投2休または、2投1休 | S-1 1回量は体表面積で算出 トラスツズマブ1回目 8mg /kg ・2回目以降6mg/kg  |
| 胃癌 | 1421-1 | オブジーボ (2週)             | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | オブジーボ 240mg /body  |
| 胃癌 | 1421-2 | オブジーボ (4週)             | 4週間                            | 1投3休(1)                                    | オブジーボ 480mg /body  |
| 胃癌 | 1422   | Weekly Nab PTX         | 4週間                            | 3投1休 PTX (1.8.15)                          | Nab-PAC 100mg /㎡   |
| 胃癌 | 1423   | RAM+Weekly Nab PTX     | RAM 2週間<br>Nab-PAC4週間          | RAM1投1休 (1.15) Nab-PAC3投1休 (1.8.15)        | RAM 8mg /kg Nab-PAC 100mg /㎡   |
| 胃癌 | 1424   | エンハーツ                  | 3週間                            | 1投2休(1)                                    | エンハーツ 6.4mg /kg  |
| 胃癌 | 1425-1 | G-FOLFOX6+オブジーボ        | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | L-OHP 85mg /㎡ 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡ オブジーボ 240mg /body                  |
| 胃癌 | 1425-2 | 末梢用G-FOLFOX6+オブジーボ     | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | L-OHP 85mg /㎡ 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡ オブジーボ 240mg /body                  |
| 胃癌 | 1426   | G-XELOX (130)+オブジーボ    | 3週間                            | L-OHP・オブジーボ 1投2休(1)<br>カベシタピン2投1休 (1~14)   | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ オブジーボ 360mg /body                                     |
| 胃癌 | 1427   | G-SOX (130)+オブジーボ      | 3週間                            | L-OHP ・オブジーボ 1投2休(1)<br>S-1 2投1休 (1~14)    | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ オブジーボ 360mg /body                                       |
| 胃癌 | 1428   | G-CAPOX (130)+トラスツズマブ  | 3週間                            | L-OHP・トラスツズマブ 1投2休(1)<br>カベシタピン2投1休 (1~14) | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ トラスツズマブ1回目 8mg /kg ・2回目以降6mg/kg                       |
| 胃癌 | 1429   | G-CAPOX (130)+キイトルーダ   | 3週間                            | L-OHP・キイトルーダ 1投2休(1)<br>カベシタピン2投1休 (1~14)  | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ キイトルーダ 200mg /body                                    |
| 胃癌 | 1430   | G-SOX (130)+キイトルーダ     | 3週間                            | L-OHP・キイトルーダ 1投2休(1)<br>S-1 2投1休 (1~14)    | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ キイトルーダ 200mg /body                                      |
| 胃癌 | 1431   | G-FOLFOX6+ピロイ          | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | L-OHP 85mg /㎡ 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡<br>ピロイ 1回目 800mg /㎡・2回目以降 400mg /㎡ |
| 胃癌 | 1432   | 末梢用G-FOLFOX6+ピロイ       | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | L-OHP 85mg /㎡ 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡<br>ピロイ 1回目 800mg /㎡・2回目以降 400mg /㎡ |
| 胃癌 | 1433   | G-CAPOX (130)+ピロイ      | 3週間                            | L-OHP・ピロイ 1投2休(1) カベシタピン2投1休 (1~14)        | カベシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg /㎡ ピロイ 1回目 800mg /㎡・2回目以降 600mg /㎡                       |
| 胃癌 | 1434   | メンテG-FOLFOX6+ピロイ       | 2週間                            | 1投1休(1)                                    | 5-FU 400mg /㎡・2400mg /㎡ I-LV 200mg /㎡<br>ピロイ 400mg /㎡                                  |

|      |        |                          |     |  |  |
|------|--------|--------------------------|-----|--|--|
| 胃癌   | 1435   | メンテG-CAPOX (130)+ピロイ     | 3週間 | ピロイ 1投2休(1) カペシタビン2投1休(1~14)                 | カペシタビン1回量は体表面積で算出 ピロイ 600mg/m <sup>2</sup>   |
| 胃癌   | 1436   | G-SOX (130)+キイトルーダ+Her   | 3週間 | L-OHP・キイトルーダ・Her 1投2休(1)<br>S-1 2投1休(1~14)   | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body<br>トラスツスマブ1回目 8mg/kg・2回目以降6mg/kg                                    |
| 胃癌   | 1437   | G-CAPOX (130)+キイトルーダ+Her | 3週間 | L-OHP・キイトルーダ・Her 1投2休(1)<br>カペシタビン2投1休(1~14) | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body<br>トラスツスマブ1回目 8mg/kg・2回目以降6mg/kg                                    |
| 頭頸部癌 | 1501   | Cetu+RT                  | 1週間 | 1投0休(1)                                      | Cetu 1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>  |
| 頭頸部癌 | 1502   | Cetu(隔週投与)               | 2週間 | 1投1休(1)                                      | Cetu 500mg/m <sup>2</sup>  |
| 頭頸部癌 | 1503-1 | CDDP+RT                  | 3週間 | 1投2休(1)                                      | CDDP 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 頭頸部癌 | 1504   | FP(800/80)療法             | 3週間 | 1投2休 CDDP(1)/5-FU(1,2,3,4,5)                 | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU 800mg/m <sup>2</sup>   |
| 頭頸部癌 | 1505   | FP(800/80)療法+キイトルーダ      | 3週間 | 1投2休 キイトルーダ・CDDP(1)/5-FU(1,2,3,4)            | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU 800mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body   |
| 頭頸部癌 | 1506   | 5FU+CBDCA+キイトルーダ         | 3週間 | 1投2休 キイトルーダ・CBDCA(1)/5-FU(1,2,3,4)           | CBDCA AUC5 5-FU 1000mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body  |
| 頭頸部癌 | 1507-1 | キイトルーダ(3週)               | 3週間 | 1投2休(1)                                      | キイトルーダ 200mg/body  |
| 頭頸部癌 | 1507-2 | キイトルーダ(6週)               | 6週間 | 1投5休(1)                                      | キイトルーダ 400mg/body  |
| 頭頸部癌 | 1508-1 | オブジーボ(2週)                | 2週間 | 1投1休(1)                                      | オブジーボ 240mg/body   |
| 頭頸部癌 | 1508-2 | オブジーボ(4週)                | 4週間 | 1投3休(1)                                      | オブジーボ 480mg/body   |
| 頭頸部癌 | 1509   | Cetu+5FU+CBDCA           | 3週間 | 1投2休 Cetu・CBDCA(1)/5-FU(1,2,3,4)             | CBDCA AUC5 5-FU 1000mg/m <sup>2</sup> Cetu 1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>                                  |
| 頭頸部癌 | 1510   | Weekly Cetu+PTX          | 1週間 | 1投0休(1)                                      | Cetu 1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> PTX 80mg/m <sup>2</sup>  |
| 膵臓癌  | 1601   | GEM                      | 4週間 | 3投1休 GEM(1,8,15)                             | GEM 1000mg/m <sup>2</sup>  |
| 膵臓癌  | 1602   | TS-1/GEM                 | 3週間 | GEM 2投1休(1,8) S-1 2投1休(1~14)                 | TS-1 1回量は体表面積で算出 GEM 1000mg/m <sup>2</sup>   |
| 膵臓癌  | 1603   | GEM/アブラキサン               | 4週間 | 3投1休(GEM 1,8,15 Nab-PAC 1,8,15)              | GEM 1000mg/m <sup>2</sup> Nab-PAC 125mg/m <sup>2</sup>   |
| 膵臓癌  | 1604-1 | FOLFIRINOX               | 2週間 | 1投1休(1)                                      | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> CPT-11 180mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 膵臓癌  | 1604-2 | ModifiedFOLFIRINOX       | 2週間 | 1投1休(1)                                      | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>                       |
| 膵臓癌  | 1604-3 | 末梢用FOLFIRINOX            | 2週間 | 1投1休(1)                                      | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> CPT-11 180mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 膵臓癌  | 1604-4 | 末梢用ModifiedFOLFIRINOX    | 2週間 | 1投1休(1)                                      | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>                       |
| 膵臓癌  | 1605   | タルセバ/GEM                 | 4週間 | 3投1休 GEM(1,8,15) タルセバ 連日服用                   | GEM 1000mg/m <sup>2</sup> タルセバ 100mg/日   |
| 膵臓癌  | 1606-1 | オニバイド/5FU/LV             | 2週間 | 1投1休(1)                                      | オニバイド 70mg/m <sup>2</sup> 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>   |
| 膵臓癌  | 1606-2 | 末梢用オニバイド/5FU/LV          | 2週間 | 1投1休(1)                                      | オニバイド 70mg/m <sup>2</sup> 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>   |
| 膵臓癌  | 1607   | GEM(放射線併用)               | 5週間 | 5投0休 GEM(1,8,15,22,29)                       | GEM 600mg/m <sup>2</sup>   |
| 胆道癌  | 1701   | GEM                      | 4週間 | 3投1休 GEM(1,8,15)                             | GEM 1000mg/m <sup>2</sup>  |
| 胆道癌  | 1702   | CDDP/GEM(外来用)            | 3週間 | 2投1休(CDDP 1.8 GEM 1.8)                       | CDDP 25mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup>   |
| 胆道癌  | 1702   | CDDP/GEM(入院用)            | 3週間 | 2投1休(CDDP 1.8 GEM 1.8)                       | CDDP 25mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup>   |
| 胆道癌  | 1703   | TS-1/GEM                 | 3週間 | GEM 2投1休(1,8) S-1 2投1休(1~14)                 | TS-1 1回量は体表面積で算出 GEM 1000mg/m <sup>2</sup>   |
| 胆道癌  | 1704   | GEM/CDDP/S-1             | 2週間 | GEM/CDDP 1投1休(1) S-1 1投1休(1~7)               | CDDP 25mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup> S-1 1回量は体表面積で算出   |
| 胆道癌  | 1705   | イミフィンジ/CDDP/GEM          | 3週間 | イミフィンジ1投2休(1) CDDP・GEM 2投1休(1,8)             | CDDP 25mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup> イミフィンジ 1500mg/body  |
| 胆道癌  | 1706-1 | イミフィンジ(メンテナンス) 30kg以上    | 4週間 | 1投3休(1)                                      | イミフィンジ 1500mg/body   |

|     |        |                                     |                                   |   |   |
|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 胆道癌 | 1706-2 | イミフィンジ（メンテナンス）30kg以下                | 4週間                               | 1投3休（1）                                       | イミフィンジ 20mg/kg  |
| 胆道癌 | 1707   | キイトルーダ+GC                           | 3週間                               | 2投1休（CDDP 1.8 GEM 1.8）キイトルーダ（1）               | CDDP 25mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body  |
| 胆道癌 | 1708   | キイトルーダ+GEM（メンテナンス）                  | 3週間                               | 2投1休（GEM 1.8）キイトルーダ（1）                        | GEM 1000mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body   |
| 胆道癌 | 1709   | キイトルーダ（メンテナンス）                      | 3週間                               | 1投2休（1）                                       | キイトルーダ 200mg/body   |
| 大腸癌 | 1801   | FOLFOX6                             | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1802   | FOLFOX6/Beva                        | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg  |
| 大腸癌 | 1803   | FOLFIRI                             | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1804   | FOLFIRI/Beva                        | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg  |
| 大腸癌 | 1805   | biweekly CPT-11                     | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1806   | 5-FU/LV                             | 8週間                               | 6投2休 5-FU/LV（1.8,15,22,29,36）                 | 5-FU 600mg/m <sup>2</sup> I-LV 250mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1807   | XELOX                               | 3週間                               | L-OHP 1投2休（1） カペシタピン 2投1休（1～14）               | カペシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1808   | XELOX/Beva                          | 3週間                               | L-OHP/Beva 1投2休（1） カペシタピン 2投1休（1～14）          | カペシタピン1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> Beva 7.5mg/kg  |
| 大腸癌 | 1809   | SOX療法（S-1/L-OHP）                    | 3週間                               | L-OHP 1投2休（1） S-1 2投1休（1～14）                  | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1810   | SOX療法/Beva                          | 3週間                               | L-OHP/Beva 1投2休（1） S-1 2投1休（1～14）             | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> Beva 7.5mg/kg  |
| 大腸癌 | 1811   | IRIS療法（S-1/CPT-11）                  | CPT-11 2週間<br>S-1 4週間             | CPT-11 1投1休（1.15） S-1 2投2休（1～14）              | S-1 1回量は体表面積で算出 CPT-11 100mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1812   | IRIS療法/Beva                         | CPT-11/Beva 2週間<br>S-1 4週間        | CPT-11/Beva 1投1休（1.15） S-1 2投2休（1～14）         | S-1 1回量は体表面積で算出 CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg   |
| 大腸癌 | 1813   | FOLFOX6/Cetu                        | 2週間                               | 1投1休（Cetuは1投0休）                               | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1814   | FOLFIRI/Cetu                        | 2週間                               | 1投1休（Cetuは1投0休）                               | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> |
| 大腸癌 | 1815   | CPT-11/Cetu                         | 2週間                               | 1投1休（Cetuは1投0休）                               | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1816-1 | Cetu（初回）                            | 1週間                               | 1投0休（1）                                       | Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1816-2 | Cetu 毎週投与（2ケル目以降）                   | 1週間                               | 1投0休（1）                                       | Cetu 250mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1816-3 | Cetu 隔週投与                           | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | Cetu 500mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1816-4 | Cetu/ピラビトキニチン（内服併用）1ケル目             | 1週間                               | 1投0休（1）                                       | Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1816-5 | Cetu/ピラビトキニチン（内服併用）<br>2ケル目以降（毎週投与） | 1週間                               | 1投0休（1）                                       | Cetu 250mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1816-6 | Cetu/ピラビトキニチン（内服併用）<br>2ケル目以降（隔週投与） | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | Cetu 500mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1817   | FOLFOX6/Pani                        | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Pani 6mg/kg  |
| 大腸癌 | 1818   | FOLFIRI/Psni                        | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Pani 6mg/kg  |
| 大腸癌 | 1819   | Pani                                | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | Pani 6mg/kg   |
| 大腸癌 | 1820   | Beva(内服薬と併用)                        | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | Beva 5mg/kg   |
| 大腸癌 | 1821   | SOX療法/Cetu                          | L-OHP/S-1 3週間<br>Cetu 1週間         | L-OHP 1投2休（1） Cetu 1投0休<br>S-1 2投1休（1～14）     | S-1 1回量は体表面積で算出 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>   |
| 大腸癌 | 1822   | IRIS療法/Cetu                         | CPT-11 2週間<br>Cetu 1週間<br>S-1 4週間 | CPT-11 1投1休（1.15） Cetu 1投0休<br>S-1 2投2休（1～14） | S-1 1回量は体表面積で算出 CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> Cetu1回目 400mg/m <sup>2</sup> ・2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌 | 1823   | FOLFIRI/RAM                         | 2週間                               | 1投1休（1）                                       | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> RAM 8mg/kg   |

|       |        |                              |                     |  |  |
|-------|--------|------------------------------|---------------------|--|--|
| 大腸癌   | 1824-1 | FOLFOXIRI                    | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | CPT-11 165mg/m <sup>2</sup> L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 3200mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>             |
| 大腸癌   | 1824-2 | modifiedFOLFOXIRI            | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup>             |
| 大腸癌   | 1825-1 | FOLFOXIRI/Beva 127-ル         | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | CPT-11 165mg/m <sup>2</sup> L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 3200mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg |
| 大腸癌   | 1825-2 | modifiedFOLFOXIRI/Beva 127-ル | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg |
| 大腸癌   | 1826-1 | FOLFOXIRI/Beve後維持療法          | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | 5-FU 3200mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg   |
| 大腸癌   | 1826-2 | modifiedFOLFOXIRI/Beve後維持療法  | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg   |
| 大腸癌   | 1827   | 5-FU/LV/Beva                 | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg                                 |
| 大腸癌   | 1828   | Beva(カペシタピンとの併用)             | 3週間                 | Beva1投2休(1) カペシタピン 2投1休(1~14)            | Beva 7.5mg/kg カペシタピン1回量は体表面積で算出  |
| 大腸癌   | 1829   | FOLFIRI/AFL                  | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> AFL 4mg/kg      |
| 大腸癌   | 1830   | XELIRI                       | 3週間                 | CPT-11 1投2休(1) カペシタピン 2投1休(1~14)         | カペシタピン1回量は体表面積で算出 CPT-11 200mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌   | 1831   | XELIRI/Beva                  | 3週間                 | CPT-11/Beva 1投2休(1) カペシタピン 2投1休(1~14)    | カペシタピン1回量は体表面積で算出 CPT-11 200mg/m <sup>2</sup> Beva 7.5mg/kg  |
| 大腸癌   | 1832-1 | Beva(S-1との併用)                | Beva 2週間<br>S-1 6週間 | Beva 1投1休(1) S-1 4投2休(1~28)              | Beva 5mg/kg S-1の1回量は体表面積で算出  |
| 大腸癌   | 1832-2 | Beva(S-1との併用)                | 3週間                 | Beva 1投2休(1) S-1 2投1休(1~14)              | Beva 7.5mg/kg S-1の1回量は体表面積で算出  |
| 大腸癌   | 1833   | SIR療法                        | 3週間                 | CPT-11 1投2休(1) S-1 2投1休(1~14)            | S-1 1回量は体表面積で算出 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>  |
| 大腸癌   | 1834   | SIRB療法                       | 3週間                 | CPT-11/Beva 1投2休(1) S-1 2投1休(1~14)       | S-1 1回量は体表面積で算出 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> Beva 7.5mg/kg  |
| 大腸癌   | 1835   | IRI+Beva                     | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> Beva 5mg/kg  |
| 大腸癌   | 1836   | ハセチン/パージェタ                   | 3週間                 | 1投2休(1)                                  | ハセチン1回目 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg パージェタ1回目 840mg 2回目以降420mg/body   |
| 大腸癌   | 1837   | フェスゴ配合皮下注                    | 3週間                 | 1投2休(1)                                  | 初回 フェスゴ配合皮下注IN 1V<br>2回目以降 フェスゴ配合皮下注MA 1V  |
| 大腸癌   | 1838   | CPT-11/Pani                  | 2週間                 | 1投1休                                     | CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> Pani 6mg/kg  |
| 前立腺癌  | 1901   | DOC75                        | 3週間                 | 1投2休(1)                                  | DOC 75mg/m <sup>2</sup>  |
| 前立腺癌  | 1902   | DOC60(高齢者用)                  | 3週間                 | 1投2休(1)                                  | DOC 60mg/m <sup>2</sup>  |
| 前立腺癌  | 1903   | ジェブタナ                        | 3週間                 | 1投2休(1)                                  | ジェブタナ 20mg/m <sup>2</sup>  |
| 尿路上皮癌 | 2011   | CDDP/GEM                     | 4週間                 | CDDP 1投3休(2) GEM 3投1休(1.8.15)            | CDDP 70mg/m <sup>2</sup> GEM 1000mg/m <sup>2</sup>   |
| 尿路上皮癌 | 2012   | CBDCA/GEM                    | 3週間                 | CBDCA 1投2休(1) GEM 2投1休(1.8)              | CBDCA AUC4.5 GEM 1000mg/m <sup>2</sup>   |
| 尿路上皮癌 | 2013   | M-VAC療法                      | 4週間                 | 4投0休(MTX1.15.22)(VLB2.15.22)(ADM/CDDP 2) | MTX 30mg/m <sup>2</sup> VLB 3mg/m <sup>2</sup> ADM 30mg/m <sup>2</sup> CDDP 70mg/m <sup>2</sup>                        |
| 尿路上皮癌 | 2014   | Weekly PTX80                 | 3週間                 | 3投0休 PTX (1.8.15)                        | PTX 80mg/m <sup>2</sup>  |
| 尿路上皮癌 | 2015-1 | キイトルーダ(3週)                   | 3週間                 | 1投2休(1)                                  | キイトルーダ 200mg/body  |
| 尿路上皮癌 | 2015-2 | キイトルーダ(6週)                   | 6週間                 | 1投5休(1)                                  | キイトルーダ 400mg/body  |
| 尿路上皮癌 | 2016   | パドセブ                         | 4週間                 | 3投1休(1.8.15)                             | パドセブ 1.25mg/kg   |
| 尿路上皮癌 | 2017   | パベンチオ                        | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | パベンチオ 10mg/kg  |
| 尿路上皮癌 | 2018-1 | adju.オブジーボ(2週)               | 2週間                 | 1投1休(1)                                  | オブジーボ 240mg/body   |
| 尿路上皮癌 | 2018-2 | adju.オブジーボ(4週)               | 4週間                 | 1投3休(1)                                  | オブジーボ 480mg/body   |
| 尿路上皮癌 | 2019   | キイトルーダ+パドセブ                  | 3週間                 | キイトルーダ 1投2休(1) パドセブ 2投1休(1.8)            | キイトルーダ 200mg/body パドセブ 1.25mg/kg   |

|      |        |                        |                                 |  |  |
|------|--------|------------------------|---------------------------------|--|--|
| 精巣癌  | 2101   | BEP                    | 3週間                             | 1投2休 CDDP/VP-16 (1.2.3.4.5)<br>3投0休 BLM (2.9.16) | VP-16 100mg/m <sup>2</sup> CDDP 20mg/m <sup>2</sup> BLM 30mg/body                                    |
| 精巣癌  | 2102   | EP                     | 3週間                             | 1投2休 CDDP/VP-16 (1.2.3.4.5)                      | VP-16 100mg/m <sup>2</sup> CDDP 20mg/m <sup>2</sup>  |
| 食道癌  | 2201   | FP(800/80)療法           | 4週間                             | 1投3休 CDDP (1) /5-FU (1.2.3.4.5)                  | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU 800mg/m <sup>2</sup>   |
| 食道癌  | 2202   | FP(700/70)療法+RT        | 4週間                             | 1投3休 CDDP (1) /5-FU (1.2.3.4)                    | CDDP 70mg/m <sup>2</sup> 5-FU 700mg/m <sup>2</sup>   |
| 食道癌  | 2203   | DOC                    | 3週間                             | 1投2休 (1)   | DOC 70mg/m <sup>2</sup>  |
| 食道癌  | 2204   | Weekly PTX100          | 7週間                             | 6投1休 PTX (1.8.15.22.29.36)                       | PTX 100mg/m <sup>2</sup>   |
| 食道癌  | 2205-1 | E-FOLFOX6              | 2週間                             | 1投1休 (1)   | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 食道癌  | 2205-2 | 末梢用E-FOLFOX6           | 2週間                             | 1投1休 (1)   | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 食道癌  | 2206-1 | E-FOLFOX6放射線併用         | 2週間                             | 1投1休 (1)   | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・1600mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 食道癌  | 2206-2 | 末梢用E-FOLFOX6放射線併用      | 2週間                             | 1投1休 (1)   | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・1600mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 食道癌  | 2207-1 | オブジーボ (2週クール)          | 2週間                             | 1投1休 (1)   | オブジーボ 240mg/body   |
| 食道癌  | 2207-2 | オブジーボ (4週クール)          | 4週間                             | 1投3休 (1)   | オブジーボ 480mg/body   |
| 食道癌  | 2208-1 | adjuオブジーボ (2週クール)      | 2週間                             | 1投1休 (1)   | オブジーボ 240mg/body   |
| 食道癌  | 2208-2 | adjuオブジーボ (4週クール)      | 4週間                             | 1投3休 (1)   | オブジーボ 480mg/body   |
| 食道癌  | 2209   | NAC DCF                | 3週間                             | 1投2休 CDDP (1) DOC (1) /5-FU (1.2.3.4.5)          | CDDP 70mg/m <sup>2</sup> DOC 70mg/m <sup>2</sup> 5-FU 750mg/m <sup>2</sup>                           |
| 食道癌  | 2210-1 | FP(800/80)療法+キイトルーダ    | 3週間                             | 1投3休 キイトルーダ・CDDP (1) /5-FU (1.2.3.4.5)           | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU 800mg/m <sup>2</sup> キイトルーダ 200mg/body                                 |
| 食道癌  | 2211-1 | FP(800/80)療法+オブジーボ (2) | オブジーボは2週間<br>CDDP (1) /5-FUは4週間 | 1投1休 オブジーボ (1/15) /CDDP (1) /5-FU (1.2.3.4.5)    | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU 800mg/m <sup>2</sup> オブジーボ 240mg/body                                  |
| 食道癌  | 2211-2 | FP(800/80)療法+オブジーボ (4) | 4週間                             | 1投3休 オブジーボ・CDDP (1) /5-FU (1.2.3.4.5)            | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> 5-FU 800mg/m <sup>2</sup> オブジーボ 480mg/body                                  |
| 食道癌  | 2212-1 | オブジーボ (2) /ヤボイ (6)     | 2週間 (オブジーボ)<br>6週間 (ヤボイ)        | オブジーボ 1投1休 (1.15.29) ヤボイ 1投5休 (1)                | オブジーボ 240mg/body ヤボイ1mg/kg   |
| 食道癌  | 2212-1 | オブジーボ (3) /ヤボイ (6)     | 3週間 (オブジーボ)<br>6週間 (ヤボイ)        | オブジーボ 1投2休 (1.22) ヤボイ 1投5休 (1)                   | オブジーボ 360mg/body ヤボイ1mg/kg   |
| 食道癌  | 2213-1 | キイトルーダ (3週)            | 3週間                             | 1投2休 (1)   | キイトルーダ 200mg/body  |
| 食道癌  | 2213-2 | キイトルーダ (6週)            | 6週間                             | 1投5休 (1)   | キイトルーダ 400mg/body  |
| 卵巣癌  | 2301   | Weekly TC (AUC2)       | 4週間                             | 3投1休 CBDCA/PTX (1.8.15)                          | CBDCA AUC2 PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 卵巣癌  | 2302   | Weekly TC (AUC5)       | 4週間                             | CBDCA 1投3休 (1) PTX 3投1休 (1.8.15)                 | CBDCA AUC5 PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 卵巣癌  | 2303   | TC                     | 4週間                             | 1投3休 (1)   | CBDCA AUC4~5 PTX 175mg/m <sup>2</sup>  |
| 卵巣癌  | 2304   | CBDCA/Weekly PTX/Beva  | 3週間                             | 1投2休 (1)   | CBDCA AUC5~6 PTX 175mg/m <sup>2</sup> Beva 15mg/kg   |
| 卵巣癌  | 2305   | Beva (メンテナンス用)         | 3週間                             | 1投2休 (1)   | Beva 15mg/kg   |
| 卵巣癌  | 2306   | CDDP/CPT-11            | 4週間                             | CDDP1投3休 (1) CPT-11 3投1休 (1.8.15)                | CDDP 60mg/m <sup>2</sup> CPT-11 60mg/m <sup>2</sup>  |
| 卵巣癌  | 2307   | GEM                    | 4週間                             | 3投1休 GEM (1.8.15)                                | GEM 1000mg/m <sup>2</sup>  |
| 卵巣癌  | 2308   | PLD                    | 4週間                             | 1投3休 (1)   | PLD 50mg/m <sup>2</sup>  |
| 卵巣癌  | 2309   | PLD/Beva               | PLD 4週間<br>Beva 3週間             | PLD 1投3休 (1) /Beva 1投2休 (1)                      | PLD 40mg/m <sup>2</sup> Beva 15mg/kg   |
| 卵巣癌  | 2310   | PLD/Beva (2週間隔)        | PLD 4週間<br>Beva 2週間             | PLD 1投3休 (1) /Beva 1投1休 (1.15)                   | PLD 40mg/m <sup>2</sup> Beva 10mg/kg   |
| 子宮体癌 | 2401   | Weekly TC (AUC2)       | 4週間                             | 3投1休(CBDCA/PTX 1.8.15)                           | CBDCA AUC2 PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |

|                |              |                        |                           |  |  |
|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| 子宮体癌           | 2402         | Weekly TC (AUC5)       | 4週間                       | CBDCA 1投3休 (1) PTX 3投1休 (1.8.15)         | CBDCA AUC5 PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 子宮体癌           | 2403         | TC                     | 4週間                       | 1投3休 (1)                                 | CBDCA AUC4~5 PTX 175mg/m <sup>2</sup>  |
| 子宮体癌           | 2404<br>(削除) | AP療法 (CDDP/DXR)        | 3週間                       | CDDP1投2休 (1) DXR 1投2休 (1)                | CDDP 50mg/m <sup>2</sup> DXR 60mg/m <sup>2</sup>   |
| 腹膜癌            | 2501         | Weekly TC (AUC2)       | 4週間                       | 3投1休(CBDCA/PTX 1.8.15)                   | CBDCA AUC2 PTX 80mg/m <sup>2</sup>   |
| MSI-high (固形癌) | 2601-1       | キイトルーダ(3週)             | 3週間                       | 1投2休 (1)                                 | キイトルーダ 200mg/body  |
| MSI-high (固形癌) | 2601-2       | キイトルーダ (6週)            | 6週間                       | 1投5休 (1)                                 | キイトルーダ 400mg/body  |
| MSI-high (大腸癌) | 2602-1       | オブジーボ (2週クール)          | 2週間                       | 1投1休 (1)                                 | オブジーボ 240mg/body   |
| MSI-high (大腸癌) | 2602-2       | オブジーボ (4週クール)          | 4週間                       | 1投3休 (1)                                 | オブジーボ 480mg/body   |
| MSI-high (大腸癌) | 2603         | カギツノホ (3週) / ヤーボイ (3週) | 3週間                       | 1投2休 (1)                                 | オブジーボ 240mg/body ヤーボイ1mg/kg  |
| 神経膠腫           | 2701         | Beva                   | 2週間                       | 1投1休 (1)                                 | Beva 10mg/kg   |
| 神経膠腫           | 2702         | Beva                   | 3週間                       | 1投2休 (1)                                 | Beva 15mg/kg   |
| 神経膠腫           | 2703         | TMZ (150) / Beva       | TMZ 4週間<br>Beva 2週間       | TMZ 1投 (5連日 (1.2.3.4.5)) 3休 Beva (1投1休)  | TMZ 150mg/m <sup>2</sup> (day1~5) Beva 10mg/kg   |
| 神経膠腫           | 2703         | TMZ (200) / Beva       | TMZ 4週間<br>Beva 2週間       | TMZ 1投 (5連日 (1.2.3.4.5)) 3休 Beva (1投1休)  | TMZ 200mg/m <sup>2</sup> (day1~5) Beva 10mg/kg   |
| 神経膠腫           | 2704         | Beva (TMZ内服併用)         | TMZ 4週間<br>Beva 2週間       | TMZ 1投 (5連日 (1.2.3.4.5)) 3休 Beva (1投1休)  | TMZ (内服) 150または200mg/m <sup>2</sup> (day1~5) Beva 10mg/kg  |
| 肝細胞癌           | 3201         | RAM                    | 2週間                       | 1投1休 (1)                                 | RAM 8mg/kg   |
| 肝細胞癌           | 3202         | テセントリク/Beva            | 3週間                       | 1投2休 (1)                                 | テセントリク 1200mg/body Beva 15mg/kg  |
| 肝細胞癌           | 3203-1       | イミフィンジ30kg超え           | 4週間                       | 1投3休 (1)                                 | イミフィンジ 1500mg/body   |
| 肝細胞癌           | 3203-2       | イミフィンジ30kg以下           | 4週間                       | 1投3休 (1)                                 | イミフィンジ 20mg/kg   |
| 肝細胞癌           | 3204-1       | イジユド+イミフィンジ 30kg超え     | 4週間                       | 1投3休 (1)                                 | イジユド 300mg/body イミフィンジ 1500mg/body   |
| 肝細胞癌           | 3204-2       | イジユド+イミフィンジ 30kg以下     | 4週間                       | 1投3休 (1)                                 | イジユド 4mg/kg イミフィンジ 20mg/kg   |
| 神経内分泌腫瘍        | 3301         | CDDP/CPT-11            | 4週間                       | CDDP 1投3休 (1) CPT-11 3投1休 (1.8.15)       | CDDP 60mg/m <sup>2</sup> CPT-11 60mg/m <sup>2</sup>  |
| 神経内分泌腫瘍        | 3302         | AMR                    | 4週間                       | 1投 (3連日 (1.2.3)) 3休                      | AMR 40mg/m <sup>2</sup>  |
| 神経内分泌腫瘍        | 3303         | CDDP/VP-16             | 3週間                       | 1投 (3連日) 2休 CDDP (1) VP-16 (1.2.3)       | CDDP 80mg/m <sup>2</sup> VP-16 100mg/m <sup>2</sup>  |
| 神経内分泌腫瘍        | 3304-1       | CBDCA/VP-16 (一般用)      | 3週間                       | 1投 (3連日) 2休 CBDCA (1) VP-16 (1.2.3)      | CBDCA AUC5 VP-16 100mg/m <sup>2</sup>  |
| 神経内分泌腫瘍        | 3304-2       | CBDCA/VP-16 (高齢者用)     | 3週間                       | 1投 (3連日) 2休 CBDCA (1) VP-16 (1.2.3)      | CBDCA AUC5 VP-16 80mg/m <sup>2</sup>   |
| 胚細胞腫瘍          | 3401         | BEP                    | 3週間                       | 3投0休 (CDDP/VP-16 1.2.3.4.5) (BLM 2.9.16) | VP-16 100mg/m <sup>2</sup> CDDP 20mg/m <sup>2</sup> BLM 30mg/body                                    |
| 胚細胞腫瘍          | 3402         | EP                     | 3週間                       | 3投0休 (CDDP/VP-16 1.2.3.4.5)              | VP-16 100mg/m <sup>2</sup> CDDP 20mg/m <sup>2</sup>  |
| 小腸癌            | 3501-1       | S-FOLFOX6              | 2週間                       | 1投1休 (1)                                 | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 小腸癌            | 3501-2       | 末梢用S-FOLFOX6           | 2週間                       | 1投1休 (1)                                 | L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> ・2400mg/m <sup>2</sup> I-LV 200mg/m <sup>2</sup> |
| 腎細胞癌           | 3601         | オブジーボ                  | 2週間                       | 1投1休 (1)                                 | オブジーボ 240mg/body   |
| 腎細胞癌           | 3602         | カギツノホ (3) / ヤーボイ (6)   | 3週間 (カギツノホ)<br>6週間 (ヤーボイ) | カギツノホ 1投2休 (1.2.2) ヤーボイ 1投5休 (1)         | オブジーボ 360mg/body ヤーボイ1mg/kg  |
| 腎細胞癌           | 3603         | ハベンチオ/イラタ (内服)         | 2週間                       | 1投1休 (1) イラタは連日服用                        | ハベンチオ 10mg/kg インライタ (内服) 1日2回  |
| 腎細胞癌           | 3604-1       | オブジーボ(1投1休) 【カギツノホと併用】 | 2週間 (カギツノホ)<br>カギツノホ 連日   | オブジーボ1投1休 (1) 【カボザンチニブ40mg/日 連日服用】       | オブジーボ 240mg/body カボザンチニブ40mg/日 連日内服  |

|       |        |                         |                          |                                   |  |
|-------|--------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 腎細胞癌  | 3604-2 | オブジーボ(1投3休)【カボザンチニブと併用】 | 4週間(オブジーボ)<br>カボザンチニブ 連日 | オブジーボ1投3休(1)【カボザンチニブ40mg/日 連日服用】  | オブジーボ 480mg/body    カボザンチニブ40mg/日 連日内服 |
| 腎細胞癌  | 3605-1 | キイトルーダ(1投2休)【レンパチニブと併用】 | 3週間(キイトルーダ)<br>レンパチニブ 連日 | キイトルーダ 1投2休(1)【レンパチニブ20mg/日 連日服用】 | キイトルーダ 200mg/body    レンパチニブ20mg/日 連日内服 |
| 腎細胞癌  | 3605-2 | キイトルーダ(1投5休)【レンパチニブと併用】 | 6週間(キイトルーダ)<br>レンパチニブ 連日 | キイトルーダ 1投5休(1)【レンパチニブ20mg/日 連日服用】 | キイトルーダ 400mg/body    レンパチニブ20mg/日 連日内服 |
| 軟部肉腫  | 3701   | ドキシルピシン                 | 3週間                      | 1投2休(1)                           | ドキシルピシン 75mg/m <sup>2</sup>            |
| 軟部肉腫  | 3702   | エリプリン                   | 3週間                      | 2投1休 ERI (1.8)                    | ERI 1.4mg /m <sup>2</sup>              |
| 原発不明癌 | 3901-1 | オブジーボ(2週クール)            | 2週間                      | 1投1休(1)                           | オブジーボ 240mg/body                       |
| 原発不明癌 | 3902-2 | オブジーボ(4週クール)            | 4週間                      | 1投3休(1)                           | オブジーボ 480mg/body                       |

